

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่มีสูงลายเป็นพาหะนำโรค โดยสูงลายไปกัดคนที่มีเชื้อโรคไข้เลือดออกแล้วไปกัดคนอื่น อีกต่อหนึ่ง ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นได้ทุกคน เป็นแล้วกับลับมา เป็นสาหร่ายได้ และในกรณีที่เป็นซ้ำจะมีอาการเสียชีวิตสูง

โรคไข้เลือดออกป้องกันได้ ด้วย

- ระวังอย่าให้ยุงกัดในตอนกลางวัน
- กำจัดลูกน้ำที่อยู่ และลดเหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งทำได้หลายวิธีดังนี้
 - ปิดปากภานะเก็บน้ำให้มิดชิดด้วยฝาลูมิเนียมหรือตาข่าย
 - หมั่นตรวจสอบเจกันดอกไม้และเปลี่ยนน้ำหากสัปดาห์
 - ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาทางนกยูง ในภาชนะเก็บน้ำที่ปิดฝาไม่ได้
 - เก็บภาชนะที่มีน้ำข้างหรือไม้ใช้แล้ว หรือค่าว่าภานะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำขัง
 - ใส่เกลือ น้ำส้มสายชู ลงชักฟอก ผสมลงในน้ำจารองตู้กับข้าวทุกสัปดาห์ เพื่อไม่ให้ยุงมาวางไข่

กำจัดบุหรี่ กำลยาเหล่งเพาะพันธุ์ร่วมด้วยกัน ป้องกันไข้เลือดออก

ป้องกันยุง...รู้จักใช้ผลิตภัณฑ์กำจัด/ไล่ยุง

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุง

ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นกำจัดยุงและแมลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของ อย. โดยผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถฉีดพ่นได้เอง จะอยู่ในรูปแบบสเปรย์ฉีดพ่นอัดก๊าซ (aerosol) สารออกฤทธิ์ที่ใช้ส่วนมากเป็นสารเคมีในกลุ่มโพเรียรอยด์ (pyrethroids)



- ใช้ผลิตภัณฑ์เท่าที่จำเป็น ไม่ใช้พรมไฟหรือใช้อ่าย่างไว้ให้ได้ผล
- เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมีการแสดงทะเบียน อย.ว.ส. (ว.ส. XXX/255X) บนฉลากของผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากหรือในแทริกให้เข้าใจก่อนใช้
- ห้ามน้ำตقطันตรายที่ใช้จากการเกษตรมาใช้กำจัดแมลงในบ้านเรือน เพราะอาจไม่ได้ผลและทำให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงได้
- อย่าฉีดพ่นในที่ที่มีอาหาร น้ำ เครื่องดื่มวางแผนอยู่ เพราะจะทำให้ปนเปื้อนได้ และไม่ควรฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย
- กรณีฉีดแมลงบิน เช่น ยุง ก่อนใช้ให้คนและสัตว์เลี้ยงออกจากห้องนั้นก่อนแล้วปิดประตูหน้าต่างไว้เรียบร้อย ในการฉีดพ่นให้ใช้ผ้าปิดปิดกับปิดมูก เขย่ากระป๋องเล็กน้อยแล้วฉีดขึ้นห้างบนห้องทั้ง 4 ด้าน ปิดประตูประมาณ 15-20 นาที จึงเปิดระบายอากาศ กรณีฉีดนอกห้องหรือที่โล่ง ให้ฉีดขณะที่ลมสงบ
- ล้างมือหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ฉีดพ่นทุกครั้ง
- เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ตกลุ้นตรายให้พ้นมือเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เบลวไฟและความร้อน ถ้าห้ามดแล้วห้ามทิ้งลงแม่น้ำ ดู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ และห้ามเผาทำลาย ควรแยกทิ้งในที่ทึ้งขยะให้เรียบร้อย

ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง

ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงออกฤทธิ์รบกวนกลไกการรับรู้กลิ่นของยุง แต่ไม่ได้มีข่ายให้ตาย
นิยมใช้ในรูปแบบทาหรือฉีดพ่นผิวหนัง โดยสารสำคัญที่พบบ่อย ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงทีมี ดีท (DEET) เป็นสารสำคัญ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมีการแสดงทะเบียน อย.วอส. (วอส. XXXX/255X) บนฉลากของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงทีมีน้ำมันตะไคร้หอม (Citronella oil) เป็นสารสำคัญ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้เจ็บหัวใจจริงของผลิตภัณฑ์ และมี การแสดงเลขที่รับแจ้งบนฉลาก ("เลขที่รับแจ้ง ๑๙๙/๒๕๕๐") ผลิตภัณฑ์ทีมีประสิทธิภาพควบคุมที่ชี้ในการไล่ยุงภายในได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

ใช้อย่างไร...ให้ได้ผล

1. อ่านฉลากและปฏิบัติตามวิธีใช้ คำแนะนำ และคำเตือนอย่างเคร่งครัด

2. ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบแป้งหรือโลชั่น ห้ามนำไปทาแกนแนปเปิ้ลหรือโลชั่นที่หัวไป ควรทา เมื่อต้องการใช้ป้องกันยุง และระวังมีให้เด็ก นำไปทาเล่น

3. ควรมาเมื่อจำเป็น อย่าใช้ติดต่อกัน เป็นประจำ

4. อย่าทาบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน เช่น บริเวณใกล้ตา ริมฝีปาก เปลือตา รักแร้ หรือบริเวณแพลง

5. ภายหลังใช้ผลิตภัณฑ์ หากต้องการหยิบจับอาหาร ควรล้างมือให้สะอาดเสียก่อน

6. เก็บผลิตภัณฑ์ให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยน้ำมันตะไคร้หอม ควรปิดฝาให้สนิท อย่าให้ถูกแสงแดด เปลวไฟหรือความร้อน

กำจัดลูกน้ำยุง...รู้จักใช้ทรายทีมีฟอส

การใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง ควรใช้ในกรณี ที่จำเป็น เช่น กรณีภาวะบรรจุน้ำใช้น้ำไม่สามารถปิดฝาหรือเปลี่ยนน้ำได้ ผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบทรายเคลือบด้วยสารกำจัดแมลงทีมีฟอส (temephos) หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า ทรายทีมีฟอส

ใช้อย่างไร...ให้ได้ผล



อัตราส่วนการใช้ทรายทีมีฟอสแต่ละรูปแบบต่อปริมาณน้ำ

ผลิตภัณฑ์	รูปแบบผลิตภัณฑ์	จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ใช้	ต่อปริมาณน้ำ
ทรายทีมีฟอส 1%	แกรนูล	1 กรัม หรือ 1 ช้อนตวง*	10 ลิตร
ทรายทีมีฟอส 2%	แกรนูล	0.5 กรัม หรือ 1/2 ช้อนตวง*	10 ลิตร
ทรายทีมีฟอส 10%	เม็ด	1 กรัม หรือ 1 เม็ด**	20 ลิตร
		1 กรัม หรือ 1 เม็ด**	100 ลิตร

* หากมีช้อนตวงแบบมีก้นผลิตภัณฑ์ และ 1 ช้อนตวง เท่ากับ 1 กรัม

** กรณีลักษณะบุ 1 เม็ดเท่ากับ 1 กรัม




ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดยุง

รู้จักใช้...



ลดภัยไข้เลือดออก



ผลิตภัณฑ์ทรายทีมีฟอสที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมที่ช่วยลดภัยไข้เลือดออก ได้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ควบคุมลูกน้ำยุงของผลิตภัณฑ์ทรายทีมีฟอส อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความถี่ของการใช้น้ำ ตลอดจนปริมาณน้ำที่ใช้ไปและปริมาณน้ำที่เติมใหม่ในแต่ละครั้ง

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทรายทีมีฟอส ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมีการแสดงทะเบียน อย.วอส. (วอส. XXXX/255X) บนฉลากของผลิตภัณฑ์ และควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ผลิต

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าติดอยู่ที่ใดในบ้านเรือนที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ที่ <http://wwwapp1.fda.moph.go.th/consumer/conframe.asp>

กำจัดน้ำขัง ยับยั้งยุงลาย ป้องกันโรคร้าย ปลอดภัยถาวรสิ่ง

ผลิตภัณฑ์โดย ก่อร่มพัฒนาเครือข่าย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค โทรศัพท์ 0 2590 7121-2 www.oryornoi.com

มิถุนายน 2556



งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลบ้านนา

อำเภอเมืองชัย จังหวัดนครราชสีมา